

Instrucțiuni de utilizare: Decolonizarea MDRO, cu soluție, șervețele umede, spumă și geluri Prontoderm®, precum și cu ProntOral®

Introducere: Germenii multirezistenți (MDRO), precum MRSA (*staphylococcus aureus* multirezistent/rezistent la meticilină), VRE (enterococi rezistenți la vancomycină) sau ESBL (bacterii secretoare de beta-lactamaze cu spectru extins), creează din ce în ce mai multe probleme în domeniul sănătății și au un impact serios asupra societății (de ex. MRSA dobandită în comunitate). MDRO pot coloniza piele. Această colonizare trebuie evitată în special înainte de intervențiile chirurgicale, la pacientii cu cateter sau la pacientii imunodeprimati, în toate situațiile, pentru a preîntâmpina probleme grave, cum ar fi infecțiile. Scopul urmărit este reducerea incidentelor unor asemenea infecții, prin decolonizare. Aceste instrucțiuni de utilizare arată cum se poate efectua simplu și eficient o decolonizare cu gama de produse Prontoderm®.

Indicații cu privire la gama de produse Prontoderm®:

- Decolonizare MDRO prin curățare fizică.
- Indicat pentru utilizarea în mediu medical.
- Indicat pentru curățarea înainte de intervenții chirurgicale.
- Efect de barieră antimicrobiană persistentă, pentru evitarea unei recolonizări printr-o floră tranzitorie.
- Stoparea creșterii, a răspândirii și a transmisiiei de MDRO.
- Reducere miroslui.

Indicații pentru ProntOral®:

- Decolonizarea MDRO a cavității bucale și a faringelui, prin curățare fizică.
- Prevenirea formării de plăci, carii, parodontoză și gingivite.
- Indicat pentru utilizarea în mediu medical.
- Efect de barieră antimicrobiană, persistentă, pentru evitarea unei recolonizări printr-o floră tranzitorie.
- Stoparea creșterii, a răspândirii și a transmisiiei de MDRO.
- Indicat pentru pacientii cu mucoase afectate (de ex, în urma radiatiilor oncologice sau chimioterapie).

Utilizatorii potențiali: personalul medical, personalul de îngrijire, căt și persoanele fără pregătire în domeniul medical, după o instruire adecvată. În spital, cămine de îngrijire și acasă.

Preparare: Este interzisă amestecarea produselor Prontoderm® sau ProntOral® cu alte substanțe sau săpunuri. Produsele Prontoderm® sunt preparate gata de utilizare. Prontoderm® șervețele umede pot fi folosite în locul lăvetelor imbibate cu Prontoderm® soluție și poate fi încălzit într-un cuptor cu microunde înainte de utilizare. Înainte de utilizare, soluția Prontoderm® poate fi încălzită la temperatura corpului (de exemplu într-o baie de apă sau incubator).

Utilizare: Curățarea întregului corp și decolonizarea pacientilor imobilizați: în funcție de talia pacientului, este necesară o soluție de cca. 300 – 500 ml Prontoderm®. După utilizarea soluției nu este necesară o călăre (produse leave-on). Pacienții se curăță cu lavete noi pentru spălare, care sunt imbicate temeinic cu soluție Prontoderm®. În acest scop, se vor utiliza cel puțin 8 lavete noi pentru spălare, curate, în plus, se utilizează mai multe betisoare cu vătă, de exemplu pentru curățarea urechilor și a nasului. După fiecare pas de utilizare, lăvetele pentru spălare, respectiv betisoare cu vătă, se debarasează sau se pregătesc din nou și se utilizează astfel încât să nu se încalzească ușor. Înălțători. De îndată ce o parte a corpului a fost complet curătată, se amplasează un cearșaf curat sub pacient, iar apoi cealaltă parte a corpului va fi curătată, așa cum este descris mai jos.

1. Îngrijire orală: Introduceți proteza dentară în soluție Prontoderm® și lăsați să acționeze cel puțin 15 min. Îndepărtați resturile cu o periuță și apoi clătiți proteza cu apă. De mai multe ori pe zi, timp de 30 de secunde (60 de secunde în caz de MRSAs) se va face gărgără cu cca. 10 ml de soluție nediluată, nu se îngurgiteză, ulterior nu se clătește.

2. Nasul: Nasul se curăță temeinic cu Prontoderm® Nasal Gel și cu un betisor cu vătă. Nasul, în special nările se vor curăță temeinic, de 3 ori pe zi. Se va împiedica formarea de cruste aderențe, pentru a se menține baza de substanță de alimentare a unei recolonizări, pe cât posibil la un nivel cât mai scăzut.

3. Spălarea părului: Părul se udă cu o lavetă pentru spălare. După 3 – 5 minute, părul se usucă cu grijă cu un prosop curat. Dacă se dorește, ulterior, părul se poate spăla cu un săpun, la alegere.

4. Față: Toate zonele cutanate se acoperă cu soluție de Prontoderm®. În timpul acestei proceduri, ochii se țin închisi. Pleoapele și toată zona ochilor se curăță cu multă atenție. După 1 – 2 minute, pielea curățată se usucă cu un prosop nou, curat.

5. Urechile: Urechea externă se curăță cu un betisor cu vătă, umezit într-o soluție Prontoderm®.

Atenție: este interzis ca soluția Prontoderm® sau alte soluții de curățare să curgă în urechea internă.

6. Partea de sus a corpului: Partea de sus a corpului se curăță începând de la capăt, în jos, iar după 1 – 2 minute, se usucă cu un prosop nou, curat.

7. Picioarele: Ambele picioare se curăță cu o lavetă nouă și se decolonizează.

8. Partea de jos a corpului: Pentru curățarea părții de jos a corpului, pentru îndepărțarea completă a miroslorilor, se pot utiliza mai multe lăvete pentru spălare.

9. Uretra și întrările de cateter: Întrările la cateterul permanent se curăță cu betisoare cu vătă imbibate, iar după 1 minut se usucă cu betisoare noi cu vătă. Curățarea se va efectua dincolo de partea interioară, spre partea exterioară.

Alte articole: Toate celelalte elemente, precum ochelari, bijuterii, proteze etc pot fi curățate cu Prontoderm® soluție sau șervețele umede pentru decolonizare. Obiectele din plastic trebuie curățate cu apă potabilă după un timp de expunere de aprox. 5 minute.

Durata de utilizare: în acord cu ghidul curent MDRO pentru decolonizare. În lipsa altor recomandări de la personalul medical de specialitate, produsele Prontoderm se vor utiliza pentru maxim 15 zile (1 până la 3 cicluri de decolonizare la fiecare 3 – 5 zile).

Măsuri de igienă suplimentare: Se recomandă pentru reducerea riscului de recolonizare și de transmitere: Dezinfecțarea mâinilor, (de exemplu cu Softa-Man®, Softalind®) înainte și după contactul cu pacientii, dezinfecțarea tuturor suprafețelor (de exemplu cu HexaQuart®, Meliseptol®), purtarea de îmbrăcăminte de protecție, etc.

Informații tehnice: eficiența și efectul de durată al gamei de produse Prontoderm® și ProntOral® dovedite prin teste in-vitro și teste practice.

Prontoderm® soluție, spumă, șervețele umede pentru curățarea întregului corp: 0,11 % poliaminopropil biguanida (polihexanidă), surfacanți, excipienți

Prontoderm® gel usor (gel cu văscositate redusă) pentru decolonizarea nasului: 0,1% poliaminopropil biguanida (polihexanidă), glicerina, hidroxietilceluloză, excipienți

ProntOral® pentru spălarea gurii: 0,15% poliaminopropil biguanida (polihexanidă), arome, ciclamat de sodiu, surfacanți, excipienți

Efecte secundare: În cazuri foarte rare, după utilizarea soluției sau a spumei de Prontoderm®, pielea poate deveni uscată sau să apară o ușoară senzație de arsură, care va disipa însă după câteva minute.

Contraindicații: Este interzisă întrebunțințarea familiei de produse Prontoderm® / ProntOral® la pacientii cu alergie, sau care sunt susceptibili la alergia la una din substanțele componente. Produsele nu se întrebunțează pentru curățarea urechii medii sau urechii interne, sau a ochilor!

Nu se utilizează în combinație cu tenside anionice, deoarece prin aceasta se poate prejudicia conservarea produsului. Îndepărtați partea de săpun de la loțiune de spălare de pe piele cu apă înainte de a folosi Prontoderm®. Se va evita utilizarea altor produse concomitent cu utilizarea produselor Prontoderm®.

Restricții de utilizare: Sarcină și alăptare: Nu se cunosc date cu privire la efectele mutagene sau toxice asupra embrionului provocate de substanțele componente. Deoarece polihexanida nu este resorbță sistemic, este reprobabilă trecerea substanței în lăptele matern. Datorită experienței clinice insuficiente cu femei gravide și cu cele care alăptă, cu noi născuți și copii mici, în aceste cazuri, aplicarea de Prontoderm® / ProntOral® trebuie făcută doar după investigații clinice efectuate cu grijă.

Instrucțiuni generale de siguranță: A se utiliza doar pe piele sau mucoasă intactă. A nu se folosi pe cale perfuzabilă sau injecabilă! Nu se îngurgiteză. În cazul în care se îngurgiteză, se clătește gura cu apă suficientă, se va bea apă suficientă și se va consulta un medic. În cazul contactului cu ochii, se clătește temeinic cu apă din abundență, chiar și sub pleoape. În cazul iritației ochilor, se va consulta medicul specialist.

Recipientul se va închide imediat după fiecare întrebunțințare. Se vor utiliza numai recipientele nedeteriorate. Arunciți șervețele Prontoderm® rămasă după utilizare. Se vor feri recipientele de razele solare directe. Dispozitiv medicinal – a nu se lăsa în îndemâna copiilor!

Informații cu privire la mediu ambient: Produsele Prontoderm® / ProntOral® pot fi debarcate pe calea apei menajere și nu au nici un efect negativ asupra sistemului de canalizare.

Инструкции за употреба: MDRO (мултирезистентни към лекарства микроорганизми) - деколонизация с Prontoderm® разтвор, кърпички, пяна, гел, ProntOral®

Увод: Мултирезистентните болестетворни микроорганизми (MDRO) като MRSA (Methicillin/мултирезистентни стафилокок [*Staphylococcus aureus*]), VRE (enterokоки, резистентни на Vancomycin) или ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) създават все повече проблеми в здравеопазването и оказват сериозно влияние върху обществото (например community-acquired (CA)-MRSA). MDRO могат да колонизират в кожата. Тази колонизация трябва на всяка цена да се избегва най-вече преди оперативни интервениции, при катетеризирани или имуносупресирани пациенти, за да се предотвратят сериозни проблеми като инфекции. Целта е да се намали инцидентността на подобни инфекции чрез деколонизация.

Настоящото утвърнение за употреба показва как бързо и лесно може да се проведе деколонизацията с продуктата от група Prontoderm®.

Индикации за продуктова група Prontoderm®:

- Деколонизация на болестетворни микроорганизми (MDRO) чрез физическо почистване.
- Подходящи за употреба в медицинска среда.
- Подходящи за предоперативно почистване.
- Ефект на трайна антимикробна бариера за избегване на реколонизацията чрез преносима флора.
- Потискане на растежа, разпространението и пренасянето на болестетворни микроорганизми (MDRO).
- Подходящи за пациенти с нарушена лигавица (например след онкологично облучване или химиотерапия).

Индикации за ProntOral®:

- Деколонизация на болестетворните микроорганизми (MDRO) в устната кухина и юрлото чрез физическо почистване.
- Предотвратяване на образуването на пласти, карies, пародонтит и гингивит.
- Подходящи за употреба в медицинска среда.
- Ефект на трайна антимикробна бариера за избегване на реколонизацията чрез преносима флора.
- Потискане на растежа, разпространението и пренасянето на болестетворни микроорганизми (MDRO).
- Подходящи за пациенти с нарушена лигавица (например след онкологично облучване или химиотерапия).

Предвидени ползватели: медици, помошни персонал и неспециалисти след съответната инструкция. В болници, домове за медицински гръжи и в дома.

Подготовка: Продуктите Prontoderm® или ProntOral® не бива да се смесват с други салуни или разтвори. Продуктите Prontoderm® са готови за употреба. Prontoderm® кърпички може да се използват вместо кърпички, напоена с Prontoderm® разтвор и може да се зареди в микровълнова furna преди употреба. Преди употреба разтворът Prontoderm® може да се затопли до телесна температура (например във водна баня или инкубатор).

Приложение: Почкистване на цялото тяло и деколонизация на имобилизираните пациенти:

В зависимост от ръста на пациента са необходими около 300 - 500 ml разтвор Prontoderm®. След приложението не е необходимо изплакване (leave-on продукти). Пациентите се почистват с чисти кърпички, напоени с разтвора Prontoderm®. За тази цел са необходими най-малко 8 свежи, чисти кърпички. Освен това са необходими няколко кърпички с памук, например за употреба в ушите и носа. След всяка стъпка от приложението кърпичите и кърпичките с памук се изхвърлят или обработват и са следващата стъпка се използват чисти материали. Щом едната страна от тялото на пациента бъде почиствана изцяло, под пациента се поставя чиста кърпичка и след това и другата страна се обработва, както е описано.

1. Орални обработки: Поставете денталната протеза в Prontoderm® разтвор и инкубрайте за поне 15 минути. После отстранете всяка къст от протезата с вода. Жабурете по няколко пъти на ден за 30 секунди (60 секунди при MRSA) с около 10 ml разреден разтвор, не попълзвайте, след това не изплакайте.

2. Нос: Почкистване носа основно с Prontoderm® Nasal Gel и кърпичка с памук. Почкистване носа и най-вече ноздрите основно поне 3 пъти дневно. Трябва да се предотврати образуването на здраво захваната коричка, за да може хранителната среда за евентуална реколонизация да се поддържа възможна най-малка.

5. Уши: Почкистване ушната мида с кърпичка с памук, напоена с разтвор Prontoderm®.

Внимание: Разтворът Prontoderm® или други почистващи разтвори не бива да проникват навътре в ухото.

6. Горна частна тялото: Почкистване горната част на тялото от тила надолу и след 1 - 2 минути подсушете със свежа, чиста кърпичка.

7. Крака: Почкистване и деколонизиране краката с чиста кърпичка.

8. Долна част на тялото: За почистване на долната част на тялото може да са необходими няколко кърпички за еlimиниране на миризимите.

9. Пикочини пътища и входове на катетери: Почкистване входовете на постоянните катетри с напоени кърпички с памук и след 1 минута подсушете с нови кърпички с памук. Почкиствайте от вътрешната страна навън.

Други предмети: Всички други предмети като очила, бижута, протези, др. могат да се избършат с Prontoderm® разтвор или кърпички за деколонизация. Пластмаси трябва да се избършат като се използва питейна вода след експозиционно време от около 5 мин.

Продължителност на употреба: Съгласно настоящите ръководства за деколонизация на мултирезистентни на лекарства организми, Ако няма други указания от Ваша здравен специалист, продуктите Prontoderm® трябва да се употребяват за максимум 15 дни (1 до 3 цикъла на деколонизация от 3 до 5 дена всеки).

Помощни хигиенни мерки: Предоръчва се да се намали рисък от реколонизация и пренасяне: дезинфекция на ръце (например със Softa-Man®, Softalind®) преди и след контакт с пациент, дезинфекция на всички повърхности (например с HexaQuart®, Meliseptol®), носене на защитно облекло и др.

Технически информации: Действието и продължителният ефект на продуктите от групата на Prontoderm® и ProntOral® изпитани в клинични тестове ин vitro.

Prontoderm® разтвор, пяна, кърпички за почистване на цялото тяло: 0,11% Полиаминопропил бигуанид (полихексанид), сърфактанти, помощни вещества

Prontoderm® Nasal Gel (никосвикозен гел) за деколонизация на носа: 0,11% Полиаминопропил бигуанид (полихексанид), глицерин, хидроксилипилолоза, помощни вещества

ProntOral® за промивки на устата: 0,15% Полиаминопропил бигуанид (полихексанид), парфюм, натриев циклат, сърфактанти, помощни вещества

Страницни действия: В много редки случаи след употребата на разтвора или пяна Prontoderm® може да възникне искушение на кожата или слабо чувство за парене, което изчезва след няколко минути.

Противопоказания: Продуктовата група Prontoderm® / ProntOral® не бива да се използва при пациенти, за които се знае, че страдат от алергии към някоя от съставките или при съмнение за такава алергия. Не използвайте продуктите в средното или вътрешното ухо или в очите! Не използвайте в комбинация с антионни тензиди, тъй като така може да се наруши консервацията.

Премахнете остатъците от салун и измивачи лосиони от кожата с вода преди употребата на Prontoderm®. Трябва да се избегва употребата на други продукти едновременно с продуктите Prontoderm®.

Ограничения при употреба: Бременност и кърмене: Няма данни, които да сочат матагени или ембриотоксични ефекти на съставките. Тъй като полихексанидът (polihexanide) не е резорбируемо системно, преминаването на субстанцията в майчиното мляко е малко вероятно. Поради недостатъчния клиничен опит с бременно и кърмещи жени, новородени и малки деца, Prontoderm® / ProntOral® трябва да се употребява в тези случаи само след внимателно клинично проучване.

Общи инструкции за безопасност: За употреба само върху интактна кожа и мукозни мембрани. Да не се използва за инфузии или инжекции! Да не се погълза. При приемане през устата, устната тръба да се изплакне, да се пие достатъчно вода и да се направи консултация с лекар. При контакт с очите да се изплакне обилно с вода, също и под клепатите. Ако дразненето от продукта простира до очите, използвайте само безупречни и неповредени бутили. Изхвърлете останалите Prontoderm® кърпички след употреба. Дръжте бутилките далече от директна слънчева светлина.

Медицински продукт – пазете от деца!

Информация за околната среда: Продуктите Prontoderm® / ProntOral® могат да се изхвърлят безопасно в